



Osteogenesis Imperfecta en Zelfmoord Veteraan

Men weet hoe men een osteogenese iatrogeen verstoort en welke chemicaliën iatrogeen zelfmoorden veroorzaken.

Het FIF-syndroom ondersteunt de bestaande evidence based medicine, waardoor de huidige geneeskunde ten eeuwige dage even lucratief een behandel-industrie kan in stand blijven houden.

Een voorwaarde blijft vereist: ... **farmacologische kennis bannen uit het circus.**

vr, 23 okt 2015 18:14:39'

Aanmelden Persbericht Sponsors Over Ons

f in e p r t v



PERSBERICHT SPONSORS OVER ONS

 Actueel aanbod voor medische doelgroepen

Home > Onderzoek > Geen aanwijzing voor verhoging zelfdoding onder militairen die op missie zijn geweest

Onderzoek Video

Advertentie

Geen aanwijzing voor verhoging zelfdoding onder militairen die op missie zijn geweest

Door Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink - 20 oktober, 2015

314 0



GEZONDHEID:CO




HOME KORT NIEUWS COLUMNS RECEPTEN NIEUWSBRIEF ADVERTEREN CONTACT

KORT NIEUWS

Subsidie voor behandelen osteogenesis imperfecta in baarmoeder

23 oktober 2015 11:11:48 door Redactie Reageer

De Europese Unie stelt 6,6 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar het behandelen van osteogenesis imperfecta vóór de geboorte. De behandeling wordt de komende jaren getest bij 20 kinderen met de meest ernstige vorm van deze 'brozebottenziekte'.



Zoek op deze website ... Zoek

KORT NIEUWS

Subsidie voor behandelen osteogenesis imperfecta in baarmoeder

Interactieve liveoperatie ZGT: borstsparende operatie en reconstructie

GGD en ROC Friese Poort organiseren Tandpoetsweek

Veteraan pleegt even vaak zelfmoord als ander

Medische gegevens Icare Jeugdgezondheidszorg online

KORT NIEUWS

Zoek op deze website ...

Veteraan pleegt even vaak zelfmoord als ander

20 oktober 2015 9:09:14 door Redactie 1 Reactie

Nederlandse militairen die op een missie zijn geweest, plegen ongeveer even vaak zelfmoord als burgers. Het zelfmoordcijfer verschilt ook niet van dat onder collega-militairen die niet of slechts kort zijn uitgezonden. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De onderzoekers keken naar meer dan 40.000 militairen die tussen 2004 en 2012 waren uitgezonden. Nederland was toen onder meer actief in Afghanistan en Irak. Van die groep maakten 22 mensen een einde aan hun leven. Dat komt neer op 0,05 procent. Van de militairen die niet of kort zijn uitgezonden, pleegde 0,08 procent zelfmoord. Onder de beroepsbevolking buiten het leger was dat 0,09 procent.

Het instituut deed onderzoek na berichten dat Amerikaanse veteranen vaker zelfmoord plegen dan anderen. Tussen 1999 en 2010 pleegden elke dag gemiddeld 22 Amerikaanse veteranen zelfmoord. In 2012 lag het aantal zelfmoorden onder veteranen hoger dan het

KORT NIEUWS

Subsidie voor behandelen osteogenesis imperfecta in baarmoeder

Interactieve liveoperatie ZGT: borstsparende operatie en reconstructie

GGD en ROC Friese Poort organiseren Tandpoetsweek

Veteraan pleegt even vaak zelfmoord als ander

Medische gegevens Icare Jeugdgezondheidszorg online



<http://www.medicalfacts.nl/2015/10/20/geen-aanwijzing-voor-verhoging-zelfdoding-onder-militairen-die-op-missie-zijn-geweest/>

Belachelijk onderzoek.

1. omdat het Ministerie van Defensie alle informatie aanlevert en vooraf heeft geselecteerd.
2. alleen militairen die op missie in Afghanistan en Irak zijn geweest. De rest zoals de missie in Libanon, Bosnië etc zijn niet in het onderzoek betrokken.
3. PTSS kan pas na jaren optreden en kan niet geheel onderzocht zijn. Paniekreacties en ernstige depressies (zoals voorkomend binnen de PTSS) kunnen zelfmoord veroorzaken, maar ook in scene gezette "ongelukken" met de dood als gevolg. Dit laatste om het gezin of de familie niet te belasten en de levensverzekering en andere verzekeringen te laten uitkeren.
4. Gezinsleden en familieleden als direct betrokkenen/informanten zijn niet ondervraagd en dus is er geen sprake van een volledig en betrouwbaar onderzoek, hooguit een papieren exercitie met een heleboel aannames waarvoor geen feitelijke informatie is gevonden.

Het Ministerie doet alleen aan valse beeldvorming om zichzelf vrij te pleiten, maar als gezonde en dus geestelijk en lichamelijk goedgekeurde mannen en vrouwen die bovendien getraind zijn in stressbestendigheid nu zelfmoord plegen dan betekent dat, dat zij onvoldoende nazorg hebben gekregen. Hun hulpverleners zijn in gebreke omdat zij de ernst van deze zaken niet hebben gezien of hebben onderschat en onvoldoende actie hebben genomen om de zelfmoord te voorkomen.

Elke zelfmoord van een militair is er een teveel.

Mvg,
Frits



Cheaters hide farmacology of psychotics

Alleen bedriegers houden het werkingsmechanisme van psychotica achter

PsychCongress NETWORK

Home About Contact Us Privacy Policy Terms of Service

The Circuitry of Fear: Understanding the Neurobiology of PTSD

September 10, 2013

Although there is a great future in research, approximately 20% to 30% of the general population are 10% to 20% of patients experience PTSD after exposure to trauma, which is a traumatic event that is a threat to life or physical health.

PsychCongress

De nieuwsbrieven 688 en 690 tonen overduidelijk aan hoe psychotisch makende stoffen, zowel in de geneeskunde als recreatief nieuwe generaties belasten met aangetast groeimateriaal.

Precies omdat het medisch en het off-label-gebruik voor vrijetijdsbesteding ervan goed opbrengt, verzwijgen overheden, universiteiten en de media op welke manier een en ander in zijn werk gaat.

Dit blijft niet duren.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 23 oktober 2015

Jaargang 6 nr. 503
9 mei 2012



Nieuwsbrief

Ferre (6) is te breekbaar om tussen zijn vriendjes te spelen



Om te voorkomen dat nog dergelijke gevallen zich voordoen, zou het volstaan om toch even proberen de verklaring voor deze aandoening te achterhalen.

Ik lees dat de jongen nu zes jaar is, dus geboren in 2006.

Dit is precies hetzelfde jaar waarin in Nederland in een en dezelfde week in de kraamkliniek in Tilburg en eentje in Amsterdam telkens armpjes of beentjes braken bij de verzorging van pasgeborenen.

De verklaring ervoor plaatste ik in m'n eerste boek (978-909021709-3) en bracht dit ook aan bij de Nederlandse tweede kamer, waar ik toen (in 2007) uitgenodigd werd. Vol ongeloof heeft men mij toen beloofd om mij in contact te brengen met de hoogste medische kringen.

Evenwel heb ik daar toen niets meer van gehoord. Waaruit ik besluit dat de verklaring die ik beschreef in dat boek misschien wel de juiste zou zijn geweest. Mij valt het op dat momenteel geen armpjes of beentjes meer raken bij pasgeborenen.

Jaargang 7 nr. 688
4 juli 2013



Nieuwsbrief

Evidentie en FIF kegelen ADHD aan diggelen



Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde sneller bij kennis

Home Nieuws Opinie Onderzoek Kennisovername Recepten Vind Je Gezond? Geneeskunde Forum Medische

Inloggen

Registree

Uitsluitend op: 00-00-2313

Over dit artikel: Het Tijdschrift Geneeskunde, 2013; 157: G1170

News

Kinderen met ADHD raken vaker ernstig gevoeld

Bidart van Oosten

Kinderen tot 10 jaar die medicatie krijgen voor ADHD behandelen ongeveer 2 keer zo vaak in het ziekenhuis na een ernstig dan niet-serieus auto-ongeluk. Het risico is het zwaarst voorop in de periode vóór het eerste mediatie-voorschot en voor de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar.

Daarbij zijn analyse van gegevens uit de Pharmaco-database, waarin gegevens over algemeen mediatie zijn gelinkt met gegevens over ziekenhuisopnames die Child Abuse Prevention 2013, beschikbaar zijn.

Een van de belangrijkste conclusies uit de Pharmaco-database, waarin gegevens over algemeen mediatie zijn gelinkt met gegevens over ziekenhuisopnames die Child Abuse Prevention 2013, beschikbaar zijn, is dat kinderen met ADHD vaker in het ziekenhuis worden opgenomen voor ernstige auto-ongelukken (AO) dan kinderen zonder ADHD. Deze auto-ongelukken worden in sommige gevallen ernstig tot fataal. De ernstigste auto-ongelukken worden in het jaar vóór de aanvang van mediatie voor ernstige auto-ongelukken (AO) gemiddeld 4,9 keer lang.

Kinderen met ADHD-mediatie bleven evenveel vaker in het ziekenhuis in andere opnames van kinderen, inclusief ernstig en ernstig zwaar verwondingen: 11,8 per 1000 personen tegen 8,3 per 1000 personen. Om te controleren voor het gebruik van andere psychotrope medicatie bleek te spreken van een 2,5 keer zo hoog risico (relatieve ratio-risico (RR) 2,5; 95% BI: 1,5-5,7). Het relatieve risico in ernstige mediatie bleef hetzelfde (RR) 2,5; 95% BI: 1,5-5,7). Het relatieve risico voor ernstig zwaar verwondingen met ADHD bleef een sterke verhoging (RR) 2,6; 95% BI: 1,5-5,7). Het relatieve risico voor ernstig zwaar verwondingen met ADHD bleef een sterke verhoging (RR) 2,6; 95% BI: 1,5-5,7). In het jaar vóór het eerste ernstig mediatie bleef in de mediatieperiode nog iets vaker ernstig dan