



# Domheid blijft scoren in FIF-based medicine

Receptor agonisten zijn psychotica.

Psychotica zijn hongerremmers.

Slechts twee lijntjes nodig om de kwakkel af te schieten.

In schizophrenia:  
**Find out if your patients could benefit from a longer dosing interval.**  
**Make Booth 619 your US Psych Congress destination.**


© Janssen Pharmaceutica, Inc. 2016 October 2016 056932-160721

 **Psych Congress  
Network**

**News**  
October 20, 2016


[Click here for web version](#) | [Share](#) | [Advertise](#)



## EATING DISORDERS

### RECEPTOR AGONIST COULD REDUCE BINGE EATING, RESEARCHERS FIND

"The results of this study provide a new window toward the development of a new class of drugs with a novel target unexplored until now," said researcher Pietro Cottone, PhD, codirector of the addictive disorders lab at Boston University.



RO5256390 en niets nieuws onder de zon.

Simpelweg precies dezelfde techniek toepassen waarmee men Prozac (fluoxetine) een dertigtal jaar geleden als wondermiddel de wereld heeft ingejaagd.

Een, met een instabiele zuurstofbrug vermomde, propylamine de mensheid verblijden om een greep op de massa te versterken.

En het gaat erin als zoete koek.

Toen geneeskunde nog een wetenschap was, vereiste de maatschappij nog kennis over scheikunde en farmacologie. Positieve evidenties en FIF (F\*\*\* Inconvenient Facts) kwamen in de plaats en ook de triomf van een chemische industrie.

De gretigheid waarmee men psychotica koosnaampjes toebedeelt blijft verbazen.

Beseffen artsen dat ze als debielen worden behandeld?

Of smeken ze erom?

Apotheker Fernand Haesbrouck, 21 oktober 2016