Blog op seniorennet
Blog op adhdfraude

www.haesbrouck.be
www.megablunder.net

Jaargang 10 nr. 1000
21 november 2016

Hyperactiviteit is een bijwerking

Een echte neurobiologische diagnose bij ADHD werd afgevoerd omwille van commercieel ongunstig.

Farmacologische kennis in de geneeskunde staat op een bedroevend en bedenkelijk laag niveau.

http://www.psychiatrictimes.com/special-reports/understanding-link-between-lead-toxicity-and-adhd

Understanding the Link Between Lead Toxicity and ADHD

September 30, 2016 | Special Reports, ADHD, Child Adolescent Psychiatry, Neuropsychiatry
By Joel T. Nigg, PhD

Several neurotoxic chemicals can disrupt brain development, which contributes to neurodevelopmental and psychiatric disorders—including ADHD. Lead is among the most studied neurotoxicants relevant to mental disorders. Because

Linked Articles
The Influence of Diet on ADHD
Environmental Toxicants and

Lage doseringen van welk gif dan ook verhogen de hyperactiviteit, omdat de ontstane gevarenreflex om het gif te bestrijden een dopingeffect tot stand brengt.

Hyperactiviteit is helemaal geen neurobiologisch diagnosecriterium voor ADHD.
Hyperactiviteit is een bijwerking van doping zelfs wanneer die zogezegd "therapeutisch" wordt toegediend.

Niet alleen lood veroorzaakt hyperactiviteit.
Ook alle andere stoffen die het lichaam aanzetten om in een hoog tempo (en dan nog dagelijks) nieuwe (kanker)weefsels te produceren als antistoffen tegen het toegediende vergif, zorgen voor een algemene mobilisatie als afweer.
Die mobilisatie wordt als doping ervaren en geeft een gevoel van welbehagen, en ook van te 'genezen'.

""Het beestje is schoon genoeg, maar 't heeft zulke heete pootjes." (Guido Gezelle – 1860 – "Heete Pootjes")

Home > TAMIFLU > PSYCHOMOTOR HYPERACTIVITY

Study of possible correlation between PSYCHOMOTOR HYPERACTIVITY and TAMIFLU

Accompanying discussion about FactMed users Questions and Concerns

http://factmed.com/study-TAMIFLU-causing-PSYCHOMOTOR%20HYPERACTIVITY.php

About this FactMed analysis covering adverse side effect reports of TAMIFLU patients who developed PSYCHOMOTOR HYPERACTIVITY.

FactMed provides MD-approved analysis to help both patients, researchers, and physicians accurately assess the risk profile for more than 20,000 different pharmaceutical products. The below report offers compiled information from Food & Drug Administration and FactMed user submissions. Between January 2004 and October 2012, 17 individuals taking TAMIFLU reported PSYCHOMOTOR HYPERACTIVITY to the FDA. A total of 9602 TAMIFLU drug adverse event reaction reports were made with the FDA during this time period. Often the FDA only receives reports of the most critical and severe cases; these numbers may therefore underrepresent the complication rate of the medication.

Medscape

NEWS & PERSPECTIVE | DRUGS & DISEASES | CME & EDUCATION | ACADEMY

Discover new treatment options, trends, and technologies
You're invited to view these innovative programs from Industry
READ MORE

Drugs & Diseases > Psychiatry

Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Toxicity

Updated: Sep 08, 2016 | Author: Tracy A Cushing, MD, MPH, FACEP, FAWM; Chief Editor: Asim Tarabar, MD more...

http://emedicine.medscape.com/article/821737-overview

Overview
- Background
- Etiology
- Epidemiology
- Prognosis
- Patient Education
- Show All

Presentation

DDx

Background

Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), widely prescribed medications for the treatment of depression, obsessive-compulsive disorder, bulimia, anorexia nervosa, panic disorder, anxiety, and social phobia, have a high therapeutic to toxicity ratio. However, although they are associated with less toxicity than tricyclic antidepressants (TCAs), they are often involved in co-ingestions that can precipitate the potentially lethal serotonin syndrome (SS). (See Etiology.)

SS represents a constellation of signs and symptoms that manifest in the neuromuscular, autonomic nervous, and gastrointestinal systems, in which concentrations of serotonin receptors are highest. SS represents the most severe end of a spectrum of serotonin excess and is characterized by mental status changes, neuromuscular hyperactivity, and autonomic instability. (See Prognosis and Presentation.)[1, 2]

The majority of antidepressants prescribed in the United States are from the SSRI family.[3, 4] Commonly prescribed SSRIs include fluoxetine (Prozac),

Discover new treatment options, trends, and technologies
You're invited to view these innovative programs from Industry
READ MORE

Recommended

DISEASES & CONDITIONS
Depression

DISEASES & CONDITIONS
Depression and Suicide

Drugs.com
Know more. Be sure.

Search

Browse all medications: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DRUGS A-Z | PILL IDENTIFIER | INTERACTIONS CHECKER | NEWS | Q & A | PRO

Bio-Planet
laat je nu alles proeven
Krijg al een voorsmaak

Home > Q & A > Questions > Can prozac make you hyper?

Can prozac make you hyper?

Asked 31 Oct 2011 by sanger4life
Active 31 Oct 2011
Topics prozac, depression, obsessive compulsive disorder, anxiety and stress

https://www.drugs.com/answers/can-prozac-make-you-hyper-472409.html

I'm on 20 mg for about 5 days now. I take it in the morning... I talk fast without thinking much, say hello to strangers, more outgoing, etc. But for the most part, just hyper, dancing, skipping, etc. I'm not bipolar... and have never been diagnosed with bipolar disorder. I am taking Prozac for depression. Just wondering if anyone else has had this happen.

5 Herbs That Beat Anxiety
Doctors Reveal 1 Weird Compound to Calm Anxiety That May Surprise You. Go to nutreance.com

Respond to this Question

Report Favorite

Responses (3)

RA Rajive Goel 31 Oct 2011

Unfortunately Prozac could cause effects that you are facing, it has been reported as an rare side effect, maybe if its too uncomfortable, please seek medical advice, he/she could perhaps change your prescription.

OOK methylfenidaat veroorzaakt hyperactiviteit.

En waarom komt er uiteindelijk nooit een neurbiologische diagnose voor ADHD?

Artsen misbruiken hun status om een toxicomanie in te stellen en te onderhouden.
Sinds men op een wetenschappelijke manier kan aantonen of de vermeende ADHD-patiënt aan een neurobiologische aandoening lijdt of niet, gaat de commerciële tak in het verzet.

Uit het persbericht leren we...

Dat er GEEN farmacologische toetsing aan het diagnosticeren van de 'aandoening' gebeurt en dat de adviezen voor het toedienen van medicatie bevestigen dat hier alleen maar GPOS wordt behandeld.
Geprojecteerd Pedagogisch Onmacht Syndroom.

Medische ADHD-diagnose wijkt voor religie van kwakzalvers

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/images/nieuws_huisartsenrichtlijn_adhd_bij_kinderen_terughoudend_met_medicatie_0.pdf

https://www.adhdfraude.net/pdf/NB837.pdf

Maar de bijwerkingen houden ons wel bezig", aldus Buitelaar.

Ook het CBG ziet geen problemen: "De balans tussen werkzaamheid en bijwerkingen is nog steeds positief, mits de medicatie goed voorgeschreven wordt. Het is niet waarschijnlijk dat psychoses en manieën een gevolg zijn van methylfenidaat", laat een woordvoerder weten.

https://www.adhdfraude.net/pdf/2009pw10p08b-gezondheid-adhders-spel.pdf

Zorgen

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck maakt zich echter zorgen over de risico's van ADHD-medicatie. "Op een cardiologencongres in Venetië in 2003 werd methylfenidaat genoemd als een van de voornaamste oorzaken van pulmonaire hypertensie. Een feit dat, net als de waarschuwing van de FDA in 2007, niet doordong tot de medische wetenschap. Methylfenidaat verwoest zenuwbanen en veroorzaakt daardoor psychoses en manieën. Maar ook

geen enkele fysiologische oorzaak van ADHD aangetoond. "De psychiatrie blijft als het gaat om dit fundamenteel onderzoek wat achter bij de rest van de geneeskunde", aldus Buitelaar.

Haesbrouck is echter een heel andere mening toegedaan. "Het werkingsmechanisme bij ADHD is wel degelijk bekend. Dit geneesmiddel valt toch onder de opiumwet? Methylfenidaat is als cocaïne-achtige een psychoticum, dat in hoge doseringen kinderen dwangmatig psychotisch en dus kalmer en geconcentreerder maakt. Hersencellen in volle groei sterven hierdoor af."

Hij gaat nog een stapje verder. "Het CBG stelde op 7 juli 2005 dat lage doseringen methylfenidaat de symptomen van ADHD zelfs doen toenemen." Volgens Haesbrouck is een lage dosering, gebruikt als diagnosticum, verantwoordelijk voor de verspreiding van de aandoening.

4.8 Bijwerkingen
Bijwerkingen gemeld met Concerta

Concerta is net als Rilatine, Ritalin, Medikinet, Equasym chemisch een methylfenidaat.

In klinische studies met Concerta (n=469) vertoonden ongeveer 62% van de patiënten ten minste één bijwerking. De meest frequent gemelde bijwerkingen waren hoofdpijn (26%), eetlustverlies (14%), slapeloosheid (14%) en maagpijn (12%).

De bijwerkingen worden als volgt uitgedrukt: zeer vaak ≥10%; vaak ≥1% tot <10%; soms ≥0,1% tot <1%; zelden ≥0,01% tot <0,1%; zeer zelden <0,01%.

Algemeen. Zeer vaak: hoofdpijn, maagpijn. Vaak: het verergeren van ADHD, asthenie. Soms: thoracale pijn, koorts, accidenteel letsel, malaise, pijn,.

Hartaandoeningen: Vaak: hypertensie. Soms: migraine, tachycardie.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 21 november 2016