

Jaargang 11 nr. 1073
21 oktober 2017



Methylfenidaat beperkt zelfmoord

Wie doodvalt kan (inderdaad) niet meer zelfmoorden.

Pharmaceutisch
WEEKBLAD

<https://www.pw.nl/nieuws/2017/methylfenidaat-beperkt-zelfmoord>

[Bekijk het](#)

NIEUWS

ACHTERGROND

VASTE RUBRIEKEN

ARCHIEF

VACATURES

Alle resultaten

Algemeen

Geneesmiddelen

Industrie

Politiek & overheid

Praktijkvoering

Methylfenidaat beperkt zelfmoord

PW42 - 17-10-2017

Methylfenidaat vermindert suïcidepogingen bij voortgezet gebruik. In databasegegevens van 25.629 gebruikers tussen 6 en 25 jaar oud uit Hong Kong waren er per 10.000 patiëntjaren 9,27 suïcidepogingen tijdens methylfenidaatgebruik.

In de negentig dagen voor de start met methylfenidaat was dat 21,45 (incidence rate ratio [IRR] ten opzichte van niet-gebruikers 6,55; 95%-BI 3,37-12,72), in de eerste negentig gebruiksdagen 12,80 (IRR 3,91; 95%-BI 1,62-9,42) en bij verder gebruik 8,43 (IRR 1,35; 95%-BI 0,77-2,38). [Man et al. JAMA Psychiatry. 2017;74(10):1048-1055.]



En omdat de jongeren die aan methylfenidaat doodvallen als uitbehandeld worden beschouwd, vallen ze dus niet dood en krijgen ze daarboven op ook de kans niet meer om te zelfmoorden.

Een macabere promotie voor de veiligheid van methylfenidaat.

Methylfenidaat wordt verdeeld onder deze handelsnamen: Ritalin(Rilatine) , Concerta , Medikinet of Equasim.

Uit: <https://www.adhdfraude.net/pdf/NB513.pdf>

Met enige regelmaat treft men in het nieuws berichten aan over het overlijden van een kind of jeugdige bij het beoefenen van een sport. En dan bedoel ik niet dingen als een val met een racefiets en ongelukkig terechtkomen. Maar de zaken die afgedaan worden als een - tot dan niet gediagnosticeerde - aangeboren hartafwijking. Houdt de inspectie statistieken hiervan bij? En zo ja, wordt hierbij dan ook voorafgaand medicijngebruik geregistreerd? Ik denk hierbij met name aan zaken als Ritalin, Concerta en Strattera, maar ook aan andere psychofarmaca. Van de eerste drie is bekend dat het gebruik gevolgen heeft voor hart en bloeddruk. Ik zou het dus graag zien dat er serieus gekeken wordt naar een mogelijk verband tussen dit soort medicatie en de noodlottige gebeurtenissen.

Hoogachtend,

Met daarop het antwoord op 7 mei 2012

Onderwerp: RE: kind bij sport overleden
Van: "_dienstpostbus IGZ meldpunt" <meldpunt@igz.nl>
Datum: Ma, 7 mei, 2012 12:17

Geachte mevrouw,

Hierbij een reactie op uw mailbericht.

De mogelijke relatie die u legt tussen een bepaald type overlijden en bepaalde typen medicatie is ongetwijfeld belangwekkend. Maar IGZ ontvangt in principe alleen meldingen en verdere informatie over calamiteiten die zich in de zorgverlening voordoen. ***Het overlijden van kinderen en jeugdigen tijdens sportbeoefening is in de regel geen zorggerelateerde calamiteit, zodat IGZ er over het algemeen geen bemoeienis mee en er geen statistische informatie over heeft.***

Hoogachtend,

Dr. J.
beoordelend inspecteur Meldpunt IGZ

Naar mijn bescheiden mening zou de volledige maatschappij eenzelfde reactie als deze mevrouw moeten UITSCHREEUWEN:

Beste Fernand,

Na je zoveelste bericht met de suggestie dat een dood bij sport drug-gerelateerd zou kunnen zijn, heb ik een vraag gesteld aan de inspectie gezondheidszorg. Zie hierbij het ontwijkende antwoord.

Ik zou denken dat zij degenen zouden moeten zijn om hier eens statistieken van bij te houden.

Zucht...

Apotheker Fernand Haesbrouck, 21 oktober 2017.